

# Cubierta vegetal espontánea **5.2**

## Establecimiento de la práctica

### ¿Qué implantar para mejorar el secuestro de carbono?

Una cubierta vegetal que surja espontáneamente en las calles, filas o taludes del viñedo.




Cubierta espontánea en el Penedès (Foto IRTA)

## Características de la implantación de la práctica

### ¿Cómo implantar la práctica que permite mejorar el secuestro de carbono?

Se dejará crecer la cubierta vegetal espontánea que nazca, cuya composición dependerá de la tipología de suelo y clima, así como del manejo previo del cultivo y del ecosistema circundante.



Cubierta vegetal de un viñedo demostrativo adyacente a un campo de cebada antes (izquierda) y después (derecha) de la siega de la cubierta espontánea. (Fotos:IRTA)

La cubierta vegetal en la totalidad del viñedo sería la práctica que más carbono secuestra. Se recomienda que esta sea gestionada usando principalmente aperos de corte (segadoras, desbrozadoras, picadoras) o un laboreo muy superficial, y dejando siempre los restos en superficie. También sería viable la eliminación mediante sistemas térmicos (vapor, microondas) o químicos (aunque el uso de herbicida se desaconseja en el contexto de prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente). Para el control hierbas en la fila se recomiendan los mismos tipos de gestión que podrían combinarse para una mayor eficiencia con mulching, ya sea procedente de la siega de la propia cubierta, ya sea de aporte externo (priorizando el mulching natural y de proximidad). También se puede utilizar ganado ovino o caprino para el control de la cubierta, que a la vez aporta nutrientes adicionales al suelo. Esta práctica es aconsejable solo durante el reposo invernal, ya que los animales también pastorean los brotes tiernos y racimos.



Siega de la cubierta vegetal (Foto IRTA).

## Cronología

### ¿Durante qué fechas a lo largo de la campaña es obligatoria la presencia de la práctica?

La cubierta vegetal viva o sus restos, deberían estar presentes a lo largo de todo el año

## Manejo de la práctica

### ¿Cómo evitar que la práctica implantada afecte al cultivo?

El mayor inconveniente del uso de cubiertas vegetales es la competencia por los recursos, especialmente el agua, pero también los nutrientes. La gestión adecuada de la cubierta vegetal debe ser aquella que permita controlar un grado de competencia adecuado con los objetivos productivos. En este sentido, las cubiertas más eficientes son aquellas cuyo ciclo vegetativo sea opuesto al de la vid (fig. 1), que presenten cubierta viva entre las fases de senescencia y hasta cuajado y que, de ser posible se vaya agostando naturalmente desde cuajado hasta post cosecha. Estas indicaciones generales, variarán en función de la pluviometría de cada año: en años más lluviosos se puede alargar la cubierta viva y en años más secos, su gestión será necesaria una gestión más temprana. Para ayudar a que la composición de la cubierta espontánea sea más favorable a nuestros intereses, además de controlar la competencia por los recursos mediante siegas, o desbroces, se pueden programar las siegas para favorecer la resiembra natural de las especies deseadas y no dejar que las especies no deseadas lleguen a florecer.

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Hem Norte	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Hem SUR	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
REPOSO												
DESBORRE												
BROTACION												
FLORACIÓN												
CUAJADO												
GUISANTE												
ENVERO												
MADURACIÓN												
VENDIMIA												
POSTCOSECHA												
SENESCENCIA												

**Figura 1.** Calendario genérico del ciclo fenológico de la vid. Las operaciones en verde se llevan a cabo en el periodo rayado. Los periodos fenológicos son muy amplios ya que dependen mucho de la combinación de variedad y zona de cultivo, junto con el manejo agronómico y la meteorología de cada año.


## Principales beneficios

### ¿Qué ventajas la presencia de cubiertas vegetales?

Las cubiertas vegetales mejoran la fijación de carbono en el viñedo, la estructura del suelo. Se indican algunas de las ventajas:

- **Mejora la estructura del suelo** gracias a la acción de las raíces de las plantas que forman parte de la cubierta. De hecho, al haber una diversidad de especies que constituyen la cubierta, esta mejora se obtiene a diferentes profundidades del perfil del suelo.
- **Aumenta la distribución del agua** debido a la acción combinada de una mejor estructura del suelo por parte de las raíces y de una infiltración más lenta debido al efecto paraguas de la parte aérea de la cubierta. La heterogeneidad que presentan en especies posibilita una mejor distribución a diferentes profundidades.
- **Reducen la erosión del terreno y la degradación del suelo.** La cubierta vegetal no sólo contribuye a la retención directa de suelo, si no también a la reducción de pérdidas de agua por escorrentía superficial.
- **Incrementa la fertilidad del suelo**, sobre todo en el caso de que en la flora sean abundantes las especies de leguminosas, que aumentan el contenido de nitrógeno en suelo.
- **Facilita las labores en el cultivo**, ya que en épocas de lluvia posibilita el paso de la maquinaria frente al suelo desnudo que fácilmente crea zonas embarradas.
- **Reducción y menor riesgo de ataques de plagas y enfermedades:** La fauna que alberga la cubierta vegetal está constituida por especies que ya sea por depredación o parasitismo, ayudan a controlar plagas del cultivo.

- **Ayuda al control vegetativo:** En zonas donde haya un exceso de vigor vegetativo, la competencia de la cubierta puede ser beneficiosa para ayudar a controlar el vigor, reduciendo las operaciones en verde y contribuyendo a un rendimiento ajustado a la calidad.
- **Aumenta la sostenibilidad del cultivo**, pues la regeneración del suelo perdido supondría un gran coste para una explotación. Haciendo el cultivo inviable a largo plazo si la degradación de este imposibilita su rentabilidad. Además, las cubiertas vegetales espontáneas no presentan costes de siembra.



- Mejora la estructura del suelo
- Reduce la erosión y la escorrentía
- Aumento de la retención de agua
- Reducción y menor riesgo de ataques de plagas y enfermedades
- Ayuda al control vegetativo:
- Aumento de la sostenibilidad del cultivo.

### ¿Qué compromisos adquiere el agricultor al implementar estas prácticas secuestradoras de carbono?

- Importancia del cuaderno de campo de la explotación: Se tendrá actualizado el cuaderno de campo de la explotación, para llevar un control de todas y cada una de las acciones que se realizan y que van a tener efecto en las prácticas agrícolas secuestradoras de carbono implantadas. En el cuaderno de campo han de recogerse los siguientes puntos:
  - Fecha y tipo de labores.
  - Fechas de abonado y siembra, tipos y dosis utilizadas.

- Fechas de aplicación de fitosanitarios, marca comercial, dosis y tipo de aplicación.
  - Fechas de recolección y rendimientos.
  - Cualquier otro evento de relevancia ocurrido en la parcela.
- **Operaciones no recomendables para mantener el carbono secuestrado:** En las parcelas que se han implantado las prácticas, no se permitirá el uso de aperos tales como vertederas, gradas, cultivadores, chisel o cualquier apero que suponga la distorsión de la estructura del suelo. Solo se permitirán el laboreo vertical a través de aperos que realicen labranza subsuperficial con un tipo arado plano para solucionar problemas de compactación.

## ¿Potencial de las prácticas agrícolas indicadas para secuestrar carbono?

Estudios científicos llevados a cabo en diferentes lugares de España indican un gran potencial del uso de cubiertas vegetales para el incremento del control de la erosión (hasta un 80%), el secuestro de carbono en el suelo (entre 0,22 y 1,19 t C/ha/año) y una mejor infiltración de agua en el viñedo (hasta un 45%), respecto a un laboreo convencional. Los resultados suelen ser apreciables entre el tercer y quinto año de la implantación de la cubierta. Estos resultados son variables según el tipo de suelo, el clima de la zona y el tipo de cubierta vegetal. Sin embargo, la gestión de la cubierta debe ser precisa para no reducir sensiblemente el rendimiento.

### SECUESTRANDO CARBONO EN VIÑEDO CON CUBIERTA VEGETAL ESPONTÁNEA ¿QUÉ DEBEMOS HACER?



#### Reducción de labores

Se evita la degradación de materia orgánica al remover y airear el suelo.

1

#### Uso de fertilizantes orgánicos (abono verde procedente de la propia cubierta)

Aumentan la materia orgánica del suelo, reducen necesidades de fertilizantes sintéticos, evitan las emisiones de otras formas de gestión de los residuos orgánicos, etc.

2

#### Manejo de la cubierta evitando que compita con la producción del viñedo

Estar atento a las condiciones meteorológicas en cuanto a precipitación y temperatura, eliminando la sustracción de agua por parte de la flora adventicia en periodos críticos para el cultivo.

3

#### Implantar las cubiertas evitando limitar la erosión lo máximo posible

Al elegir la disposición de las calles en las que se van a dejar crecer las cubiertas, éstas deben de ser seleccionada de manera que, preferentemente, las franjas de vegetación queden de forma perpendicular a la línea de máxima pendiente.

4